

2012-06-01

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Information till patienter angående egenblodgivning

Egenblodgivning (autolog blodgivning) kan göras inför planerade operationer.

Patientens hälsa ska tillåta avtappning av 450 mL blod det önskade antalet gånger utan risk. En vuxen person bör som regel tappas på högst 13 % av sin blodvolym vid ett och samma tillfälle.

Blodvolymen är relaterad till kroppsvikten. Vi använder därför en nedre gräns på 50 kg patientvikt för blodgivning.

Din läkare skickar remiss till Centrum för Aferes och Stamcellshantering cirka 8 veckor före planerad operation.

Ett blodtappningsprogram planeras därefter med start cirka 5 veckor före operationsdagen. Ofta kan blodtappningen göras 2-3 gånger med en veckas intervall.

Du kommer att tappas på 450 mL blod per tillfälle. Hållbarheten är 6 veckor.

Din läkare beslutar om du kan genomföra blodtappningen utan risk. Generellt gäller att du inte får ha svår hjärt- eller lungsjukdom, virusorsakad gulsot, HIV eller annan smittsam sjukdom, blodbrist eller högt blodtryck. Även vissa mediciner kan utgöra hinder för blodtappningen.

Vid frågor kontakta Centrum för Aferes och Stamcellshantering,
telefon 517 759 14