

## Patientanvisning för Calprotectin i feces

### Inför provtagningen behövs

- Remiss eller elektronisk beställning
- Fecesor eller fecesburk med sked
- Transporthylsa
- Om provet ska skickas med post behövs: Transportkuvert, adresserat och frankerat



Fecesor med sked  
och transporthylsa



Fecesburk med sked  
och transporthylsa

### Provtagning

1. Fecesorret (det inre röret) ska vara märkt med namnetikett eller nummeretikett alternativt skriv ditt namn och personnummer.
2. Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd skeden och fyll fecesorret med avföring motsvarande **minst** en tesked. Fyll dock inte röret mer än till hälften. Sätt tillbaka skeden i fecesorret och skruva på locket.
3. Stoppa röret i transporthylsan och skruva på locket ordentligt. Förvara gärna provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.
4. **Om du har fått en pappersremiss:** Fyll i datum och tid för provtagningen på remissen. Kontrollera att numret på provtagningsrör och remiss överensstämmer.
5. Lämna provet till laboratoriet inom 2 dagar.
6. **Om provet ska skickas med post:** Lägga provet och remissen i transportkuvertet och lämna på närmaste postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.