

برای کودکان

راهنمای بیماران جهت جمع آوری ادرار (مقدار یک شبانه روز)
با اسید کلریدریک

برای تعیین:

دستورالعملهای ویژه:

توجه!

گالن (0/5 لیتر) حاوی 4 میلی لیتر اسیدکلریدریک 6 ام (سوزنده) است. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. کودک نبایستی مستقیماً در گالن ادرار کند!

مرحل آماده سازی:

فقط از گالنهایی مجاز استفاده کنید که آنها را می توانید از آزمایشگاه یا مطب دریافت کنید.

تمام ادرار طی 24 ساعت در گالن دارای مواد افزودنی جمع آوری میگردد.

چنانچه کودک طی مدت زمان جمع آوری ادرار اشتباهاً بطور مستقیم در توالیت ادرار کند، آزمایش جمع آوری ادرار ناموفق تلقی خواهد شد. در اینصورت با آزمایشگاه یا مطب تماس گرفته و دوباره یک گالن دیگر دریافت کنید و جمع آوری ادرار را تکرار کنید.

به شیوه زیر انجام دهید:

بگذرید کودک صبح (مثلاً ساعت 7) به توالیت برود و ادرار کند.
این ادرار را جمع آوری نکنید. ساعت آنرا یادداشت کنید.

از آن به بعد تمام ادرار خود طی 24 ساعت آینده را در گالن جمع آوری کنید.

وقتی کودک صبح روز بعد (مثلاً ساعت 7) ادرار کند، این ادرار را نیز در گالن جمع آوری کنید.
ساعت آنرا یادداشت کنید.

گالن را طی جمع آوری ادرار ترجیحاً در جای خنک نگهداری کنید.
برای برخی آزمایشها گالن بایستی در جای خنک نگهداری شود.

توجه داشته باشید که گالن بایستی تا خط (0/4 لیتر) پُر شود. اگر مقدار ادرار طی شبانه روز از 1/5 لیتر بیشتر باشد بایستی ادرار در چندین گالن جمع آوری شود.

نام و شماره شناسائی فردی خود، تاریخ و ساعات جمع آوری را روی گالن/گالنها بنویسید و سپس به آزمایشگاه تحویل دهید.