


2010-05-06

Patientanvisning för bakterieodling

Inför provtagningen behövs

- Remiss
- Baktset, med provrör och pinne
- Transporthylsa
- Om provet ska skickas med post behövs: transportkuvert, adresserat och frankerat



Baktset
Pinne och provrör

Transporthylsa

Provtagning

Observera, vid upprepade provtagningar bör proverna tas på olika dagar.

1. Både Provröret och transporthylsan ska vara märkt med namnetikett eller nummeretikett från remissen, alternativt skriv ditt namn och personnummer.
2. Vrid av den rosa korken från provröret.
3. Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Doppa provpinnen i avföringen. Kontrollera att det finns synlig avföring på pinnen. Stoppa provpinnen i provröret. Bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.
4. Lägg röret i transporthylsan. Förvara provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.
5. Fyll i datum för provtagningen på remissen. Kontrollera att numret på provtagningsrör och remiss överensstämmer.
6. Lämna provet snarast, helst samma dag, på närbeläget närvårdslaboratorium.
7. Om provet ska skickas med post.
Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna på närmaste postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.