


2010-05-06

Patientanvisning för VRE provtagning

Inför provtagningen behövs

- Remiss
- Baktset, med pinne och provrör
- Transporthylsa
- Om provet ska skickas med post behövs:
Transportkuvert, adresserat och frankerat



Baktset
Pinne och provrör

Transporthylsa

Provtagning på vårdcentral

Lämna remiss, Baktset, med provrör och provpinne, transporthylsan och transportkuvert till personalen på mottagningen.

Provtagning i hemmet

1. Märk både provröret och transporthylsan med medföljande namnetikett eller med nummeretikett som finns på remissen, alternativt skriv ditt namn och personnummer på röret.
2. Vrid av den rosa korken på provröret.
3. För upp provpinnen ca 5 cm i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut ur tarmen.
Det går även att samla avföringen på ett papper och doppa provpinnen i avföringen. Kontrollera att det finns synlig avföring på pinnen. Stoppa provpinnen i provröret. Bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.
4. Lägg röret i transporthylsan. Förvara provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.
5. Fyll i datum för provtagningen på remissen.
6. Lämna provet snarast, helst samma dag, på närbeläget närvårdslaboratorium.
7. Om provet ska skickas med post
Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna på närmaste postkontor. Undvik fredagar eller dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.