

Information till remitterande:

Spermaanalys vid utredning av mannen i den barnlösa förbindelsen

Om anamnes ger misstanke om påverkan på mannen eller om barnlösheten varat mer än 15 månader rekommenderas **fullständig spermaanalys**.

Förenklad spermaanalys riktar sig till par med kortvarig primär barnlöshet (< 15 månader) och där anamnes hos mannen inte givit misstanke om påverkad funktion i manliga reproduktionsorganen.

Syftet med spermaanalys är att finna de män som har klart avvikande resultat och att erbjuda dem kontrollprov och därefter fördjupad andrologisk utredning och behandling. För män med godtagbara resultat rekommenderas fortsatta försök till spontan graviditet förutsatt att utredningen av kvinnan givit normala resultat.

1. Par där mannen har godtagbara resultat

Ingen ytterligare utredning av mannen i grundutredningen.

2. Par där mannen har avvikande resultat

a) **Vid infektion/inflammationstecken** anges detta i remissvaret och Du tar ställning till om indikation för antibiotikabehandling av mannen föreligger. Kontrollspermprov analyseras bäst **3 månader** efter avslutad behandling, dvs en spermiebildningscykel, efter avslutad behandling. Du sänder oss en ny remiss för kontrollspermprov och anger när behandlingen avslutats. Till patienten ger Du den skriftliga patientinformationen.

Ett behandlingsprogram vi använder vid Andrologiskt Centrum, är **parbehandling** enligt nedan med **start menscykeldag 1** och **fortsatt sexuell aktivitet med kondom** under behandlingen. Start menscykeldag 1 är motiverat för att säkerställa att behandling ej sker av kvinnan under tidig graviditet. Fortsatt sexuell aktivitet rekommenderas för att dränera de accessoriska könskörtlarna och gångsystemet. Parbehandling och samlag med kondom är motiverat för att motverka ping-pong överföring av infektion.

Dag	Preparat	Styrka, dosering
Mannen		
1-10	Metronidazol (ex Flagyl)	400 mg, 1 x 3
11-21	Kinolonderivat	
	Tarivid	200 mg, 2 x 2
	eller Ciproxin	750 mg, 1 x 2
	eller Lexinor	200 mg, 2 x 2
22-39	Kinolonderivat	
	Tarivid	200 mg, 1 x 2
	eller Ciproxin	500 mg, 1 x 2
	eller Lexinor	200 mg, 1 x 2
Kvinnan		
1-5	Metronidazol (ex Flagyl)	400 mg, 1 x 3
6-12	Kinolonderivat	
	Tarivid	200 mg, 1 x 2
	eller Ciproxin	250 mg, 1 x 2
	eller Lexinor	200 mg, 1 x 2

b) **Vid andra avvikelser** föreslås i remissvaret, att Du remitterar mannen för kontrollprov och därefter för andrologisk utredning till Andrologiskt Centrum. Efter utredning eller behandling vid Andrologmottagningen föreslås handlingsplan i remissvaret.

Har du begärt: + fördjupad andrologisk utredning vid avvikelse innebär det att vi skickar svar till dig, brev till patienten (med kopia till dig) samt att vi kallar patienten för kontrollprov och därefter till fördjupad utredning vid avvikelse i kontrollprovet.

