

VIREAD

Hur ska man ta Viread?

- På apoteketiketten står hur stor dos du ska ta.
- Viread tas en gång om dagen ungefär samma tid varje dag.
- Viread tas med mat.

Hur ska Viread förvaras?

Förvara Viread i rumstemperatur.

Vilka läkemedel kan man inte ta med Viread?

Tala om för din läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta din läkare om du får nya mediciner utskrivna.

Vilka receptfria preparat kan man ta med Viread?

Du kan till exempel ta Alvedon, Curadon, Panodil, Alka-Seltzer, Aspirin, Bamyl, Magnecyl, Dispril eller Treo för att lindra värk och feber. Dimor, Imodium eller Travello kan tas vid diarré och Clarityn eller Versal vid allergi. Camalox, Link, Novalucol, Novaluzid och Rennie kan tas mot halsbränna och sur mage.

Vad kan Viread ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Viread. Besvären varierar från person till person och kan vara illamående, yrsel och kräkningar.

Kan man dricka alkohol när man tar Viread?

Små mängder alkohol vid enstaka tillfällen påverkar inte Viread. Tänk dock på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos?**
Om det gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din dos ska du ta den glömda dosen så snart som möjligt. Vänta annars tills nästa dos ska tas. Dubblera inte nästa dos för att kompensera för den glömda.
- **Tagit dubbel dos?**
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.
- **Kräks?**
Om du kräks inom en halvtimme efter att du tagit din dos ska du ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.