

## **EPIVIR**

### **Hur ska man ta Epivir?**

- På apoteketiketten står hur stor dos du ska ta.
- Epivir tas två gånger om dagen med 12 timmars mellanrum (Epivir 150 mg) eller tas en gång dagligen (Epivir 300 mg).
- Epivir kan tas antingen med eller utan mat.
- Tabletterna brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vätska

### **Hur ska Epivir förvaras?**

Förvara Epivir i rumstemperatur.

### **Vilka läkemedel kan man inte ta med Epivir?**

Vissa mediciner ska inte kombineras med Epivir. Tala därför om för din behandlande läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta alltid läkare om du får nya mediciner utskrivna.

### **Vilka receptfria preparat kan jag ta med Epivir?**

Du kan till exempel ta Alvedon eller Panodil för att lindra värk och feber. Dimor, Imodium eller Travello kan tas vid diarré och Clarityn eller Versal vid allergi. Camalox, Link, Novalucol, Novaluzid och Rennie kan tas mot halsbränna och sur mage.

## **Vad kan Epivir ge för biverkningar?**

En del personer får biverkningar av Epivir. Besvären varierar från person till person.

Biverkningarna kan vara huvudvärk, illamående, diarré och trötthet. Magbesvären kan minska om Epivir tas tillsammans med mat. Illamående och huvudvärk brukar gå över efter en månads behandling.

Om du får svåra smärtor i bukens övre del och eventuellt kräks kan det bero på inflammation i bukspottkörteln och du ska då kontakta din mottagning.

## **Kan man dricka alkohol när man tar Epivir?**

Små mängder alkohol vid enstaka tillfällen påverkar inte Epivir. Tänk dock på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

## **Vad gör man om man :**

- **Glömt att ta en dos?**

Om det gått mindre än 6 timmar sedan du skulle ha tagit din dos av Epivir 150 mg ska du ta den glömda dosen så snart som möjligt. Vänta annars tills nästa dos ska tas. Dubblera inte nästa dos för att kompensera för den glömda.

Om det gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din dos av Epivir 300 mg ska du ta den glömda dosen så snart som möjligt. Vänta annars tills nästa dos ska tas. Dubblera inte nästa dos för att kompensera för den glömda.

- **Tagit dubbel dos?**

Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.

- **Kräks?**

Om du kräks inom en halvtimme efter att du tagit din dos ska du ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

## **Vem ska man prata med om man har några frågor?**

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

