

PREZISTA

Hur ska man ta Prezista?

- På apoteksetiketten står hur stor dos du ska ta.
- Prezista 600mg tas *två* gånger dagligen, alltid tillsammans med 100mg Norvir *två* gånger dagligen.
- Prezista 400mg och 800mg tas *en* gång dagligen, alltid tillsammans med 100mg Norvir *en* gång dagligen.
- Prezista ska tas tillsammans med mat.

Hur ska Prezista förvaras?

Förvara Prezista i rumstemperatur (högst 25°C).

Vilka läkemedel kan man inte ta med Prezista?

Tala om för din läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta din läkare om du får nya mediciner utskrivna.

Några av de läkemedel som inte skall användas samtidigt med Prezista är:

- Ergotaminalkaloider mot migrän, t.ex. Orstanorm, Anervan
- Amiodaron, kinidin, bepridil mot hjärtsjukdomar, t.ex. Cordarone, Kiniduron (licensläkemedel)
- Lovastatin, simvastatin mot högt kolesterol, t.ex. Zocord
- Rifampicin mot tuberkulos, t.ex. Rifadin, Rimactan

- Midazolam, triazolam mot ångest och sömnproblem, t.ex. Dormicum, Halcion
- Sertindol mot psykiatriska problem, t.ex. Serdolect
- Preparat som innehåller Johannesört.

Vilka receptfria preparat kan man ta med Prezista?

Du kan till exempel ta Alvedon och Panodil för att lindra värk och feber. Dimor, Imodium eller Loperamid kan tas vid diarré och Zyrlex, Cetirizin eller Acura vid allergi. Link, Novalucol, Novaluzid och Rennie kan tas mot halsbränna samt Omeprazol och Ranitidin mot sur mage.

Vad kan Prezista ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Prezista. Besvären varierar från person till person och kan vara allergiska reaktioner, illamående, yrsel, kräkningar, huvudvärk, diarré, förstoppning, magont, trötthet, sömnlöshet och utslag. Utslaget kan också bero på en allvarlig sjukdom och därför ska du alltid kontakta läkare om du får utslag.

Kan man dricka alkohol när man tar Prezista?

Små mängder alkohol påverkar inte Prezista. Tänk dock på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos Prezista 600mg?**
Försök komma ihåg att ta Prezista på rätt tid! Om du märker detta inom 6 timmar efter missad dos ska du omedelbart ta tabletterna. Men om du märker det senare än 6 timmar efter missad dos ska du hoppa över tabletterna och ta nästa dos som vanligt. Om du helt har glömt en dos ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.
- **Glömt att ta en dos Prezista 400mg eller 800mg?**
Försök komma ihåg att ta Prezista på rätt tid! Om du märker detta inom 12 timmar efter missad dos ska du omedelbart ta tabletterna. Men om du märker det senare än 12 timmar efter missad dos ska du hoppa över tabletterna och ta nästa dos som vanligt. Om du helt har glömt en dos ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.
- **Tagit dubbel dos?**
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.
- **Kräks?**
Om du kräks inom en halvtimme efter att du tagit din dos ska du ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.