

## STRIBILD

### Hur ska man ta Stribild?

- På apoteksetiketten står hur stor dos du ska ta.
- Stribild tas en gång om dagen med 24 timmars mellanrum.
- Stribild ska tas tillsammans med mat.
- Stribild ska sväljas hel, tablettens får inte tuggas, krossas eller delas.

### Hur ska Stribild förvaras?

Förvara Stribild i rumstemperatur (högst 25°C). Tabletterna är fuktkänsliga så förvara dem i burken och skruva åt locket ordentligt.

### Vilka läkemedel kan man inte ta med Stribild?

Tala om för din läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta din läkare om du får nya mediciner utskrivna.

#### Läkemedel som inte ska användas samtidigt med Stribild är:

- Rifampicin (Rifadin, Rimactan) mot infektioner.
- Epilepsi/krampläkemedel innehållande karbamazepin (Tegretol, Trimonil, Hermolepsin), fenobarbital (Fenemal) eller fenytoin (Epanutin, Lehydan, Fenantoin).
- Migränläkemedel med dihydroergotamin (Orstanorm) eller ergotamin (Anervan).
- Lovastatin, simvastatin mot högt kolesterol (Zocord).

- Hjärtläkemedlen amiodaron (Cordarone) eller kinidin.
- Midazolam (Dormicum) via munnen eller triazolam (Halcion) mot ångest och sömnproblem.
- Cisaprid (magproblem), pimoqid (psykiska problem), alfuzosin (prostataförstoring) respektive sildenafil (pulmonell arteriell hypertension).
- Preparat som innehåller Johannesört.

### Vilka receptfria preparat kan man ta med Stribild?

Du kan till exempel ta Alvedon och Panodil för att lindra värk och feber. Dimor, Imodium eller Loperamid kan tas vid diarré och t.ex. Zyrlex, Cetirizin eller Acura vid allergi. *Om du tar antacidum (t.ex. Novalucol, Novaluzid, Rennie) mot sur mage eller ett multivitamin tillskott ska du ta detta minst 4 timmar före eller minst 4 timmar efter Stribild.*

### Vad kan Stribild ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Stribild. Besvären varierar från person till person och kan vara illamående, kräkningar, yrsel, huvudvärk, diarré, trötthet, svaghetskänsla och utslag.

**Kvinnor får inte bli gravida medan de tar Stribild. Använd en effektiv preventivmetod.**

### Kan man dricka alkohol när man tar Stribild?

Små mängder alkohol påverkar inte Stribild. Du ska ta Stribild som vanligt även om du intar en alkoholhaltig dryck. Tänk på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

### Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos Stribild?**  
**Försök komma ihåg att ta Stribild på rätt tid!** Om du märker detta inom 18 timmar efter att den missade dosen skulle ha tagits ska du ta tabletten tillsammans med mat så snart som möjligt. Men om du märker det senare än 18 timmar efter att den missade dosen skulle ha tagits ska du hoppa över den dosen och ta nästa dos som vanligt. Om du helt har glömt en dos ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.
- **Tagit dubbel dos?**  
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.
- **Kräks?**  
Om du kräks inom 1 timme efter att du tagit din dos ska du ta en ny dos tillsammans med mat. Om du kräks efter 1 timme efter du tagit din dos ska du inte ta en ny dos utan ta nästa dos som vanligt. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

### Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.