

KIVEXA

Hur ska man ta Kivexa?

- På apoteketiketten står hur stor dos du ska ta.
- Kivexa tas 1 gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag.
- Du kan ta Kivexa med eller utan mat.
- Tablettarna brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vätska.

Hur ska Kivexa förvaras?

Förvara Kivexa i rumstemperatur, högst 30°C.

Vilka läkemedel kan man inte ta med Kivexa?

Vissa mediciner ska inte tas tillsammans med Kivexa. Det är därför viktigt att du talar om för din behandlande läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta alltid din läkare då du får nya mediciner utskrivna.

Berätta alltid att du behandlas med Kivexa om du läggs in på sjukhus.

Ha alltid med dig varningskortet som finns i förpackningen!

Vilka receptfria preparat kan man ta med Kivexa?

Du kan ta Alvedon, Panodil eller Reliv för att lindra feber och värk. Dimor, Imodium eller Loperamid kan tas vid diarré och Cetirizin, Acura eller Zyrlex vid allergi. Vid halsbränna och sur mage kan du ta Link, Novalucol, Novaluzid eller Rennie.

Vad kan Kivexa ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Kivexa. Besvären varierar från person till person och kan vara huvudvärk, illamående, diarré och trötthet.

Enstaka personer kan få en reaktion av Kivexa som ger feber, hudutslag, andfåddhet, hosta, halsont, illamående, kräkningar, diarré, smärtor i magen, trötthet, värk i kroppen och allmän sjukdomskänsla. Om du får något/några av dessa symtom under de 6 första veckorna av behandlingen, kontakta din läkare. Risker att du får den här typen av symtom är minimal eftersom du gjort en test innan för att kontrollera att du tål Kivexa.

Avbryt **aldrig** behandlingen och påbörja **aldrig** behandling på nytt efter ett avbrott utan att rådfråga din läkare.

Kan man dricka alkohol när man tar Kivexa?

Små mängder alkohol vid enstaka tillfällen påverkar inte Kivexa. Tänk dock på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos?**
Försök komma ihåg att ta Kivexa på rätt tid! Om du glömmer en dos ska du ta den så snart du kommer på det. Fortsätt sedan din medicinering som vanligt. Om du helt har glömt en dos ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.
- **Tagit dubbel dos?**
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.
- **Kräks?**
Om du kräks inom en halvtimme efter att du tog senaste dosen ska du ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Infektionskliniken och Sjukhusapoteket Karolinska Huddinge
2005-10-17, uppdaterad 2012-08-31.
Upphovsrätt: Infektionskliniken och Apoteket Farmaci AB
Uppdatering ombesörjs av Sjukhusapoteket Karolinska Huddinge