

TIVICAY

Hur ska man ta Tivicay?

- På apoteksetiketten står hur stor dos du ska ta och hur ofta.
- Tivicay tas en gång om dagen med 24 timmars mellanrum eller två gånger per dygn med 12 timmars mellanrum. Din läkare talar om för dig hur just du ska ta Tivicay.
- Tivicay kan tas med eller utan mat.
- Tivicay ska inte tas samtidigt med antacida (läkemedel som neutraliserar saltsyra), kalcium (kalk), järn eller multivitaminer. Dessa preparat ska tas antingen 2 timmar *efter* eller 6 timmar *före* Tivicay.

Hur ska Tivicay förvaras?

Förvara Tivicay i rumstemperatur (högst 25°C).

Vilka läkemedel kan man inte ta med Tivicay?

Tala om för din läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta din läkare om du får nya mediciner utskrivna.

Läkemedel som inte ska användas samtidigt med Tivicay är:

Läkemedel mot epilepsi innehållande karbamazepin (Tegretol, Trimonil, Hermolepsin), oxkarbamazepin (Trileptal), fenobarbital (Fenemal) eller fenytoin (Epanutin, Lehydan, Fenantoin). Preparat som innehåller Johannesört.

Vilka receptfria preparat kan man ta med Tivicay?

Du kan till exempel ta Alvedon och Panodil för att lindra värk och feber. Dimor, Imodium eller Loperamid kan tas vid diarré och t.ex. Zyrlex, Cetirizin eller Acura vid allergi. *Om du tar antacidum (t.ex. Novalucol, Novaluzid, Rennie) mot sur mage, kalk/kalcium, järn eller ett multivitaminintillskott ska du ta detta minst 6 timmar före eller minst 2 timmar efter Tivicay.*

Vad kan Tivicay ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Tivicay. Besvären varierar från person till person och kan vara huvudvärk, illamående, kräkningar, yrsel, diarré, svårt att sova, ont i magen.

Kan man dricka alkohol när man tar Tivicay?

Små mängder alkohol påverkar inte Tivicay. Du ska ta Tivicay som vanligt även om du intar en alkoholhaltig dryck. Tänk på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos Tivicay?**
Försök komma ihåg att ta Tivicay på rätt tid! Om du märker detta mer än 4 timmar innan nästa dos ska tas ska du ta den missade dosen direkt. Men om du märker det mindre än 4 timmar innan nästa dos ska tas ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Om du helt har glömt en dos

ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.

- **Tagit dubbel dos?**
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.
- **Kräks?**
Om du kräks inom 1 timme efter att du tagit din dos ska du ta en ny dos. Om du kräks efter 1 timme efter du tagit din dos ska du inte ta en ny dos utan ta nästa dos som vanligt. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.