


2022-04-28
Ukrainska
Patientanvisning
Klamydia vaginalsekret i urin

Інструкція пацієнта для обстеження на хламідії виділення піхви в сечі

Перед відбором проб необхідно

- Хламідіасет для сечі, з трубками і піпетками
- Пластиковий стакан
- Реміс/ направлення лікаря
- Пробірка для калу з ложкою
- Транспортний контейнер
- Якщо зразок повинен бути відправлений поштою, потрібно: транспортувати конверт з адресою і порто



Аналіз

Тест бажано здавати вранці або не раніше двох годин після останнього сечовипускання.

1. Позначте пробірку та транспортний контейнер з включеною міткою імені або з міткою номера, що вказаний в направленні або напишіть своє ім'я та номер соціального страхування на трубці.
2. Помочитися приблизно на 2 см в пластиковому стаканчику, важливо, щоб з'явилася найперша сеча.
3. Тримайте трубку вертикально і акуратно торкніться плоскої поверхні, щоб видалити краплі в гвинтовому ковпачку.
4. Відкрутіть кришку пробірки. Всмоктати сечу піпеткою і наповнити пробірку до тих пір, поки кількість сечі не опиниться між лініями на чорних стрілках.
5. Вставте тестову паличку в піхву на кілька см і прокрутіть паличкою кілька разів уздовж стінки піхви.
6. Енергійно опустіть паличку в пробірку зі зразком сечі і вичавіть рідину. Викиньте паличку. Ретельно закрутіть кришку і перемішайте зразок, повертаючи трубку 3-4 рази
7. Покладіть пробірку в транспортний контейнер.
8. Залиште зразок якомога швидше в місцевій лабораторії.
9. Якщо зразок повинен бути відправлений поштою.

Покладіть зразок і направлення в транспортний конверт і залиште в поштовій скриньці або на пошті.