

Patientanvisning, blod i avföringen (F-Hb)

Tre på varandra följande prover, tagna olika dagar, krävs för säker diagnostik. Om du har mens eller blödande hemorrojder ska du vänta med att ta provet tills den blödningen avstannat.

Provtagning

1. Ta med dig provröret och något att samla avföringen på till toaletten. Det kan till exempel vara en tidning, en papperstallrik eller toalettpapper. Se till så att det inte kommer urin eller vatten på avföringen.
2. Skruva av den **gröna** korken från provröret. På insidan av den gröna korken sitter en provtagningspinne med skåror där provet ska samlas.
3. Rör runt med pinnen i hela avföringen tills alla skåror i pinnen är fyllda. Om avföringen är hård drar du med pinnen på flera ställen på avföringens yta.
4. På bild nr 4. ser du hur mycket avföring som behövs. Har det fastnat mer torkar du bort det med lite papper.
5. Sätt tillbaka provpinnen i provröret och skruva fast korken. Se till att röret är rent på utsidan och inte läcker. Blanda genom att vända eller skaka röret.
6. Provet förvaras i rumstemperatur.
7. Lämna in provet till laboratoriet så snart som möjligt.



Figur 1



Figur 2



Figur 3



Figur 4



Figur 5