

Patientanvisning, Idag är det tyvärr för sent att ge smärtlindring

Barn under sju år bör få möjlighet till smärtlindring vid venprovtagning.

För smärtlindring används EMLA® plåster eller kräm.

- Plåster eller kräm måste sitta på huden en timme, ibland längre för att ge bra smärtlindring. Därför hinner personalen inte ta proverna innan laboratoriet stänger för dagen.
- Ni kan få plåster eller kräm med er hem så att ni kan sätta på de hemma.
- Personalen kan visa var på huden plåster eller kräm ska sitta.
- Plåster eller kräm ska sättas på de två ställen personalen har visat, minst en timme, ibland längre, innan ni kommer för provtagning.
- Efter att plåstren eller krämen tagits bort på laboratoriet ska man vänta ca 10-15 minuter innan provtagning.
- Vill ni att personalen sätter på plåster eller kräm, behöver ni komma till laboratoriet senast, två timmar före stängningstid

Observera:

Emlaplåster eller kräm ska inte placeras på hudområde med utslag, eksem eller sår.

Dosering till Nyfödda barn och spädbarn 0-2 månader: Ett plåster appliceras på det utvalda hudområdet. Appliceringstid: högst 1 timme. Använd högst 1 plåster under en 24-timmarsperiod.

Använd inte Emla om du är allergisk mot lidokain, prilokain eller liknande typer av lokalbedövningsmedel

(Referens: Fass.se)