KAROLINSKA
Universitetslaboratoriet

2022-12-15
Finska
Patientanvisning för klamydiaundersökning, vaginalsekret i urin

Potilasohje, Klamydia tutkimusta varten, emätinerite virtsassa

Muovimuki | Klamydiaset för urin Klamydian koeputki | Näytteen-ottotikku | Kuljetusputki

Ennen näyttenottoa tarvitaan

- Tutkimuspyyntö
- Muovimuki
- Koeputki Klamydia näytteenottoa varten ja pipett
- Näytteenottotikku
- Kuljetusputki
- Jos näyte lähetetään postitse tarvitaan:
- kuplapussi, jossa on osoite ja leimam

Virtsanäytteen ja emätineritteen otto rovtagning

Näyte olisi otettava mieluiten aamulla tai alkaisintaan kahden tunnin kuluttua siitä kun viimeksi virtsasit.

1. Merkitse koeputki nimellä, henkilötunnuksella tai lausuntopyynnössä olevalla etiketillä.
2. Virtsaa noin 2 cm muovimukiin, on tärkeä että alkuvirtsaa saa mukaan.
3. Pidä koeputki pystyasennossa.
4. Kierrä korkki irti koeputkesta. Ime virtsaa pipettiin ja täytä putki sen verran, että nesteen pinta koeputkessa asettuu putken sivuissa olevien mustien nuolien väliin. Sulje koeputken korkki tiiviisti ja käännä putkea 3-4 kertaa.
5. Työnnä näytteenottotikku emättimeen ja pyöritä tikku pari kierrosta emättimen seinämää pitkin.
6. Pyöritä tikku voimakkaasti virtsaputkessa, purista neste tikusta ja heitä se pois. Sulje koeputken korkki tiiviisti ja käännä koeputki 3-4 kertaa.
7. Laita koeputki kuljetusputkeen.
8. Vie näyte mahdollisimman nopeasti läheisempään laboratorioon
9. Jos koe lähetetään postitse:
   Laita koeputki ja tutkimuspyyntö kuplapussiin ja vie postikonttoriin tai postilaatikkoon.