

2022-12-15

Franska

Patientanvisning för
klamydiaundersökning, urin

Instructions au patient pour le dépistage de Chlamydia, échantillon d'urine

Avant la prise d'échantillon, vous devez avoir :

- Une lettre de renvoi (remiss)
- Un gobelet en plastique
- Un set de dépistage de Chlamydia, avec tube et pipette
- Tube de transport
- Si l'échantillon doit être envoyé par la poste, Vous avez besoin d'une enveloppe de transport affranchie avec adresse



Un gobelet
en plastique

Set de
dépistage de
Chlamydia
échantillon
d'urine

Tube de
transport

Prise d'échantillon

Prenez de préférence l'échantillon le matin ou, au plus tôt, deux heures après la dernière fois que vous avez uriné.

1. Marquez votre nom et votre numéro personnel (*Personnummer*) sur le tube à essai et sur le tube de transport ou sur l'étiquette parvenue avec la lettre de renvoi.
2. Urinez dans le gobelet en plastique (2 cm d'urine environ), il est important que ce soit *le premier jet* d'urine.
3. Tenez le tube en position verticale.
4. Dévissez le bouchon du tube à essai. Prélevez l'urine avec la pipette et remplissez le tube jusqu'à ce que l'urine soit entre les deux lignes indiquées par les flèches noires. Revissez fermement le couvercle et retournez le tube 3 à 4 fois de haut en bas.
5. Insérez le tube à essai dans le tube de transport.
6. Déposez l'échantillon dès que possible, de préférence le même jour, à un laboratoire à proximité de chez vous.
7. Si l'échantillon doit être envoyé par la poste, insérez l'échantillon et la lettre de renvoi dans l'enveloppe de transport et déposez-la dans la boîte aux lettres ou au bureau de poste le plus proche.