

2022-12-15

Franska

Patientanvisning för klamydiaundersökning,  
vaginalsekret i urin

## Instructions au patient pour le dépistage de Chlamydia, sécrétions vaginales dans l'urine

### Avant la prise d'échantillon, vous devez avoir :

- Une lettre de renvoi (*Remiss*)
- Un gobelet en plastique
- Un set de dépistage de Chlamydia, avec tube et pipette
- Bâtonnet
- Tube de transport
- Si l'échantillon doit être envoyé par la poste, Vous avez besoin d'une enveloppe de transport affranchie avec adresse



Un gobelet en plastique    Set de dépistage de Chlamydia pour échantillon d'urine    Bâtonnet    Tube de transport

### Prise d'échantillon

*Le test doit de préférence être pris le matin ou, au plus tôt, deux heures après la dernière fois que vous avez uriné.*

1. Marquez votre nom et numéro personnel sur le tube à essai et sur le tube de transport ou sur l'étiquette parvenue avec la lettre de renvoi.
2. Urinez dans le gobelet en plastique (2 cm d'urine environ), il est important que ce soit *le premier jet* d'urine.
3. Tenez le tube en position verticale.
4. Dévissez le bouchon du tube à essai. Prélevez l'urine avec la pipette et remplissez le tube jusqu'à ce que le niveau d'urine soit entre les deux lignes indiquées par les flèches noires.
5. Insérez le bâton de quelques centimètres dans votre vagin et faites-le tourner plusieurs fois le long de la paroi vaginale.
6. Agitez brusquement le bâton dans le tube avec l'échantillon d'urine et pressez le contre la paroi afin de faire sortir le liquide. Jetez le bâton. Revissez fermement le couvercle et retournez le tube de haut en bas 3 à 4 fois.
7. Insérez le tube à essai dans le tube de transport.
8. Déposez l'échantillon dès que possible, de préférence le même jour, à un laboratoire à proximité de chez vous.
9. Si l'échantillon doit être envoyé par la poste, insérez l'échantillon et la lettre de renvoi dans l'enveloppe de transport et déposez -la dans la boîte aux lettres ou au bureau de poste le plus proche.