

Klamidya tainısı: idrarla birlikte vajinal sıvı tahlili için hasta talimatları

Örnek almadan önce gereklidir

- Sevk kâğıdı
- Plastik bardak
- Klamidya seti: İdrar için tüp ve pipet
- Pamuklu örnek çubuğu
- Taşıma kılıfı
- Örnek posta yoluyla gönderilecek ise:
Adres yazılı ve pulu yapışık yapışık sevkiyat zarfı



Plastik bardak

İdrar için Klamidya seti

Örnek çubuğu

Taşıma kılıfı

Örnek alma

Tercihen ilk sabah idrarı ya da idrara çıktıktan en erken iki saat sonra yapılan idrar alınmalıdır.

1. Tüp ve taşıma kılıfını isim ve kimlik numarası ile ya da sevk kâğıdının numara etiketi ile işaretleyin.
2. Plastik bardağa yaklaşık 2 cm kadar idrar yapın, ilk gelen idrarın alınması önemlidir.
3. Tüpü dik tutun.
4. Tüpün kapağını çıkarın. İdrarı pipetle emin ve tüpü idrarla siyah oklardaki çizgiler arasına gelinceye kadar doldurun.
5. Test çubuğunu vajina içine birkaç cm sokun ve çubuğu vajina duvarı boyunca birkaç kere döndürün.
6. Test çubuğunu içinde idrar örneği bulunan tüpün içine koyup iyice çalkalayın ve sıvıyı test çubuğunun ucunu tüpün iç kenarına bastırarak sıkın. Çubuğu atın. Kapağı sıkıca kapatın ve tüpü 3-4 kez aşağı yukarı döndürerek örneği karıştırın.
7. Tüpü taşıma kılıfının içine koyun.
8. Örneği en kısa zamanda en yakın sağlık ocağı laboratuvarına bırakın.
9. Örnek posta yoluyla gönderilecek ise.
Örneği ve sevk kâğıdını sevkiyat zarfının içine koyun ve bir posta kutusuna atın ya da postaneye bırakın.