

Avsändare/svarsmottagare (fullständig adress och kombikod)	Personnummer, namn, adress
Remiss till Centrum för Aferes och Stamcellshantering L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm Tel: 08-517 749 88 alt. 517 759 14	Patientens telefonnummer, dagtid
	Remissdatum
AUTOLOG BLODGIVNING	
Information till remitterande klinik, se blankettens baksida	
Aktuell diagnos Planerad operation Operationsdatum.....Önskat antal blodenheter 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	
Övriga diagnoser..... Patientens allmäntillstånd..... Mediciner..... Blodtryck mm Hg Hbg/L Viktkg	
Patienten förväntas tolerera järntabletter 100 mg x 2 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Remitterande läkare har tagit del av informationen på blankettens baksida och bedömer att patienten kan tappas utan risk för allvarlig biverkan <input type="checkbox"/> Ja Läkares underskrift:.....datum..... Namnförtydligande:.....	
Ankomstregistrerad i TakeCare den Sign:	

Information till remitterande klinik

Autolog blodgivning (egenblodgivning) kan göras inför planerade operationer.

Patientens hälsa ska tillåta avtappning av 450 mL blod det önskade antalet gånger utan risk. En vuxen person bör som regel tappas på högst 13 % av sin blodvolym vid ett och samma tillfälle. Blodvolymen är relaterad till kroppsvikten. Vi använder därför en nedre gräns på 50 kg patientvikt för blodgivning.

Remissen skickas till Centrum för Aferes och Stamcellshantering cirka 8 veckor före planerad operation. Ange antal önskade blodenheter. Ett blodtappningsprogram planeras därefter med start cirka 5 veckor före operationsdagen. I regel kan blodtappning genomföras med en veckas intervall upp till 2-3 gånger beroende på patientens tillstånd.

Patienten kommer att tappas på 450 mL blod per tillfälle. Hållbarheten är 6 veckor i kylförvaring.

Efter avslutat blodgivningsprogram sänds blodenheterna till sjukhuset där operationen ska äga rum.

Vid blodbeställning ska BAS-test (serologiskt förenlighetsprovning) utföras på vanligt sätt. På blodbeställningssedeln anges att autologblod finns.

Debitering sker oavsett om blodenheterna används eller ej.

Kontraindikationer

- Svår hjärt- eller lungsjukdom (t.ex. arytm, aortasten, instabil angina, hjärtsvikt), blödarsjukdom
- HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, anti-HTLV I/II eller lues positiv
- hypertoni (> 180/100)
- hypotoni
- ålder < 16 år
- vikt < 50 kg
- Hb < 110 g/l

Relativa kontraindikationer

- medicinering med betablockerare

Vid frågor kontakta Centrum för Aferes och Stamcellshantering, telefon 517 759 14