

R2	Postoperativ överlevnad efter levertransplantation
Mått	Andel patienter som är vid liv efter 1 år efter att patientens genomgått levertransplantation utav alla patienter som är att betrakta som en standardtransplantation.
Mätenhet	Procent, redovisas som rullande 12 månader, kvartalsvis
Syfte	Måtten visar andelen av levertransplantationspatienter med en normalrisk som överlever efter att ha genomgått transplantation Måtten avser att mäta kvaliteten och tillgängligheten på vården i innan och under levertransplantation och även det fortsatta omhändertagandet i vårdkedjan efter utskrivning från NHV-enheten. En standardtransplantation definieras som en transplantation med ett riskpanorama som på förhand kan betecknas som ett lågriskscenario. Det innebär att patienten inte skall ha uttalade riskfaktorer i form av hög ålder, avancerad leversjuklighet eller andra svårt komplicerade faktorer till ingreppet. Det innebär också att det donerade organet och under vilka omständigheter omhändertagandet skett har fallit inom standardkriterier. Andelen standardtransplantationer uppgår för närvarande till ca 50% av alla levertransplantationer i Sverige.
Typ av indikator	Medicinska resultat
Datakälla	SLTR
Datakällans status	Nationell datakälla, kontinuerlig uppdatering
Felkällor och begränsningar	Endast resultat för standardtransplantationer redovisas (c:a 50% av alla transplantationer. På grund av relativt små volymer kan enstaka dödsfall resultera i en relativt stor procentuell skillnad.
Teknisk beskrivning	Populationen är alla standardtransplantationer som genomförts under året. En standardtransplantation ska uppfylla följande kriterier: • MELD-score (Model for end stage liver disease) ≤ 20 • BAR score (Balance of risk) ≤ 9 (BAR är ett sammansatt mått som innefattar donatorsålder, MELD hos recipient, recipientålder, Retransplantationsstatus, respiratorvård recipient, kall ischemitid) • Ej akut leversvikt • Ej respiratorvård • Ej DCD (donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd) • Inga kirurgiska riskfaktorer (Retransplantation, portatrombos, tidigare stor abdominell kirurgi, split och reducerade graft) • Ej barn Täljare: Antal levertransplantationer, enligt nämnaren, där patienten är vid liv efter 1 år från det att patienten genomgått levertransplantation Nämnare: Samtliga patienter som genomgått standardlevertransplantation under det aktuella året.
Beskrivning för patienten	Indikatorm mäter andelen patienter som under en 12-månadersperiod överlevt minst 1 år efter <i>genomförd levertransplantation</i> . Alla diagnoser är inkluderade men för att kunna göra en bra jämförelse med andra enheter har här valts att redovisa utfallet för transplantation som genomförts under standardiserade betingelser, s.k. standardtransplantation. Denna grupp utgörs av transplantationer med ett förväntat normalt riskutfall. Övriga transplantationer t.ex. re-transplantationer, akuta transplantationer, transplantationer vid svår sjuklighet och/eller hög ålder har en förväntad något högre riskprofil och innefattas inte i denna indikator. Observera att resultatet bygger på patienter som har transplanterats för minst 1 - 2 år sedan då det krävs minst 1 års uppföljning för att studera 1-årsöverlevnad.