

Reproduktionsmedicin

Datum 2017-08-31
Patientinformation 16193-1

Information om Zika-virus till patienter som planeras genomgå assisterad befruktning

Vid Zikavirus-infektion under graviditet finns en risk för smitta till och skada på fostret.

Personer som planerar en icke nödvändig resa till Zikavirus-smittat område bör överväga att ändra sina resplaner. Om resa ändå sker så rekommenderar vi att man följer Folkhälsomyndighetens råd hur man förhindrar smitta. Se [Folkhälsomyndighetens hemsida](#).

Alla par som har varit i område med risk för Zikavirus-smitta bör skydda sig mot sexuell smitta och undvika att bli gravida under minst sex månader efter att de lämnat Zikavirus-smittat område om partnern är en man och minst åtta veckor om partnern är en kvinna.

För att undvika risk för Zikavirus-smitta under en eventuell graviditet uppkommen efter assisterad befruktning så utförs inte behandling med assisterad befruktning på par under sex månader efter att de lämnat Zikavirus-smittat område om partnern är en man och minst åtta veckor om partnern är en kvinna.

Personer som i samband med utlandsresa har fått symtom på infektion rekommenderas uppsöka infektionsklinik för bedömning.

För aktuell information om det internationella smittläget hänvisas till [ECDC](#), [CDC](#) och [WHO](#):s hemsidor.