

Neonatal

Föräldramedverkan



Du är viktig för barnet! Detta är en hjälp för att lära känna ditt barn här på sjukhuset.



Läkaren undersöker ditt barn under förmiddagen varje vardag. Därför vill vi att du är här mellan klockan 9 och 12.



Innan du tar i ditt barn: Ta av dig ringar och klocka, tvätta händerna med tvål, gnid därefter in händerna med handsprit. Små barn på sjukhus är mycket infektiöskänsliga.



Sitt med ditt barn hud mot hud. Hudkontakten med dig är viktig för både ditt barn och dig.




Byt blöja. Se till att blöjan har rätt storlek och sitter lagom hårt.

Neonatal

Föräldramedverkan



Sköt barnets dagliga hygien. Tvätta av eller bada ditt barn. Gör munvård på ditt barn.




Undersök barnets hud - bakom öron, hals, armhålor och ljumskar. Titta så att naveln ser bra ut och inte luktar illa.



Kontrollera att du kan snurra på ID-bandet så att det inte sitter för hårt.



Vi väger barnet tillsammans.




Vi mäter barnets längd och storleken på huvudet.

Neonatal


Föräldramedverkan




Följ hygienrutiner innan måltid.
Om barnet orkar/kan så lägg barnet till bröstet för att amma.



Barnet ska ligga "mage mot mage", gapa stort och bröstvårtan ska vara mellan näsan och överläppen.
Använd amningsnapp om det behövs.



- Kontrollera att matningssonden ligger rätt.
- Kontrollera att tejpens, som håller sonden på plats, sitter fast.
- Kontrollera att rätt siffra syns på sonden.



Mata barnet genom sonden. Det tar ungefär 30 minuter. Ge samtidigt några droppar mat i munnen.



Vi ger barnet mediciner i sonden.

Neonatal


Föräldramedverkan




Din bröstmjök är viktig för ditt barn!
Pumpa ut mjök till ditt barn, gärna 8
gänger per dygn.
Det är också viktigt för din
mjökproduktion att du själv äter och
dricker.




Om din bröstmjök inte räcker så
behöver barnet få bröstmjök som andra
mammor har lämnat till sjukhuset. Den är
noga kontrollerad.



Vi mäter barnets temperatur.
Normal temp är 36,5 - 37,3 grader.
Personalen visar dig.



Den röda lampan (POX) mäter ditt barns
syremättnad.



Personalen har kontroll på
övervakningsapparaturen och
förklarar det du vill veta.