

Prover vid misstänkt trombotisk/trombocytopen biverkan till Astra Zenecas Covidvaccin

Analysnamn	Förklaring/kommentar
Trc(B)-IPF	Andel omogna trombocyter, belyser huruvida trc-peni beror på minskad produktion eller konsumtion. Snabb och inte så dyr, går i samma rör som blodstatus.
B-TPK, MPV, PDW	Trombocytindicies, kostar inget extra om blodstatus beställs. Kan vid uttalad trombocytopeni ofta inte bestämmas.
B-Erythrocytmorfologi	Med frågeställning 'Förekomst av schistocyter?'.
B-Trombocytopeniutredning	Trombocytantikroppar analyseras på KITM
P-LD	Föreligger hemolys?
S-Haptoglobin	Föreligger hemolys?
P-Bilirubin	Föreligger hemolys?
P-Bilirubin, konj	Föreligger hemolys?
B-Direkt antiglobulintest (DAT)	Hemolysutredning
P-Kreatinin P-Natrium, P-Kalium	Njurfunktion
U-Testremsa	Njurskada
P-ALAT	Leverskada
P-PK(INR)	Koagulationsstatus
P-APT-tid	Koagulationsstatus
B-Rotem med fibrinogen	Koagulationsstatus
P-Fibrinogen	Koagulationsstatus
P-Fibrin-D-dimer	Koagulationsstatus
P-Antitrombin (tromb)	Koagulationsstatus
Vid trombos, blödning, och/eller trombocytopeni, överväg:	
P-HIT-ak IgG	HIT-liknande antikroppar Citratplasma som analyseras för HIT-ak i Solna och/eller Tyskland. OBS! I skriv i kommentarsrutan i den elektroniska beställningen: "Analys av HIT-liknande antikroppar post AZ-covidvaccin". Ange även datum för vaccination, samt kliniskt förlopp inklusive datum så trombocyter börjat sjukna och lägsta värde för Tpk. Vanligen tar det 4-16 dagar innan antikroppseffekter uppstår. Beställs ej om trombocytopeni saknas.
Erc(b)-HbF, flödescyt	HIT-liknande antikroppar EDTA-blod som analyseras för HIT-liknande ak i Tyskland. OBS! I skriv i kommentarsrutan i den elektroniska beställningen: "Analys av HIT-liknande antikroppar post AZ-covidvaccin".
<i>Om HIT-liknande antikroppar har uteslutits, bör även andra orsaker till trombocytopeni såsom iTTP, aHUS, PNH, malign grundsjukdom samt antifosfolipidantikroppar utredas.</i>	
P-Spec Koag (PPP)	ADAMTS-13 Vid misstanke om TTP/HUS, beställs ej om hemolystecken saknas; ange "ADAMTS13" i rutan "önskad analys".
P-Spec Koag (PFP)	Ange "Extra prov för ev. komplettering post AZ-covidvaccin" i rutan "önskad analys"
<i>På de första patienterna kan man eventuellt även komplettera med P-Faktor VIII, P-von Willebrandfaktor och P-Faktor V för att få känsla om endotelet eller trombocytterna är aktiverade</i>	

Utomlänsbeställare kan behöva detaljer om hur de ska beställa, provta och transportera specialprover till Karolinska Universitetslaboratoriet. I dessa fall rekommenderas vår hemsida <https://www.karolinska.se/lab> eller KUL kundtjänst **08-517 719 99**, vardagar 8.00-16.30.