

2020-05-27

Utarbetat av Trine Karlsson och Maria Sennström

Fastställt av Karin Pettersson

## Trombosprofylax vid Covid-19 hos gravid

### **Gravida kvinnor med symtom på Covid -19 som ej behöver inläggning:**

Provtagning:

SARS-CoV2 nasopharynx PCR.

APTT, fibrinogen, CRP, D-dimer, PK-INR, antitrombin och blodstatus.

Ska ha trombosprofylax med Fragmin normaldosprofylax

<90 kg ges 5000E Fragmin x 1

>90kg ges 7500E Fragmin x 1.

Planeras för telefontid för provsvar dagen efter. Ska ha Fragmin profylax i 2-4 veckor med telefonkontakt för ställningstagande till fortsatt profylax efter ungefär 2 veckor.

Ställningstagande till fortsatt profylax beroende på tillfriskningsgrad och andra riskfaktorer, ev ny kem lab enligt ovan om indicerad.

*Obs kontraindikationer för trombosprofylax, ex blödningsbenägenhet.*

### **Gravida kvinnor som vårdas inläggande pga Covid-19:**

Provtagning enligt ovan.

- Patienter med lindrig-måttlig symtombild: Profylax normaldos enligt ovan.
- Patienter med uttalad symtombild: Profylax högdos

<90kg ges Fragmin 5000E x 2

>90kg ges Fragmin 7500E x 2

### **Gravida som skrivs ut efter behandling för Covid-19:**

*Om påvisad tromboembolism under vårdtiden gäller särskilt PM*

Ställningstagande till normaldos eller högdosprofylax ska tas innan utskrivning beroende på lab svar, sjukdomsduration, allvarlighetsgrad och övriga riskfaktorer.

- Om förlöst ska patienten ha profylax i 4 veckor från utskrivning med telefonkontakt till spec MVC innan 4 veckor för ställningstagande till ev förlängning beroende på tillfriskningsgrad och andra riskfaktorer, ev ny kem lab enligt ovan om indicerad.
- Om patienten är gravid vid utskrivning ska patienten ha profylax i minst 4 veckor med telefonkontakt till SpecMVC innan 4 veckor för ställningstagande till ev förlängning beroende på tillfriskningsgrad och andra riskfaktorer, ev ny kem lab enligt ovan om indicerad.

**Referenser:**

- 1: SFOG råd trombosprofylax vid Covid – 19. (April 2020)
- 2: Karolinska; PM; Utskrivning av patienter som drabbas av venös tromboembolism eller fått trombosprofylax under vårdtiden pga covid-19. (April 2020)
3. Jecko Thachil, Ning Tang, Satoshi Gando , Anna Falanga , Marco Cattaneo , Marcel Levi , Cary Clark , Toshiaki Iba· ISTH Interim Guidance on Recognition and Management of Coagulopathy in COVID-19. Practice Guideline J Thromb Haemost 2020 May;18(5):1023-1026. doi: 10.1111/jth.14810. Epub 2020 Apr 27.