

ATRIPLA

Hur ska man ta Atripla?

- På apoteketiketten står hur stor dos du ska ta.
- Atripla tas en gång om dagen, samma tidpunkt varje dag. För att undvika vissa biverkningar kan det vara bra att ta Atripla när man går och lägger sig.
- Svälj Atripla tillsammans med ett glas vatten.

Hur ska Atripla förvaras?

Atripla förvaras i rumstemperatur. Se till att skruva åt burkens lock ordentligt eftersom tableterna är fuktkänsliga.

Vilka läkemedel kan man inte ta med Atripla?

Det är viktigt att du talar om för din behandlande läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta alltid din läkare då du får nya mediciner utskrivna.

Du ska till exempel inte ta: Anervan, Dormicum, Halcion, Midazolam, Triazolam, Orstanorm, Itrakonazol, Vfend eller preparat som innehåller Johannesört.

Vilka receptfria preparat kan man ta med Atripla?

Du kan till exempel ta: Alvedon, Panodil eller Reliv för att lindra värk och feber. Vid diarré kan du ta Dimor, Imodium eller Loperamid. Vid allergi kan du ta Acura, Cetirizin, Zyrlex eller Tavegyl. Om du behöver ta mediciner mot halsbränna och sur mage kan du använda Link, Novalucol, Novaluzid eller Rennie.

Vad kan Atripla ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Atripla. Besvären varierar från person till person.

Vanliga biverkningar är huvudvärk, illamående, diarré, yrsel och obehagliga drömmar. Om du får yrsel eller blir dåsig ska du undvika bilkörning och andra riskfyllda uppgifter.

Om du får hudutslag av Atripla kontakta din läkare. Utslagen är dock oftast övergående.

Kan man dricka alkohol när man tar Atripla?

Vissa personer mår illa om de dricker alkohol när de tar Atripla och risken för biverkningar kan öka. Tänk också på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos?**

Försök komma ihåg att ta Atripla på rätt tid! Om du glömmet en dos ska du ta den så snart du kommer på det. Fortsätt sedan din medicinering som vanligt. Om det är mindre än 12 timmar till nästa dos ska du inte ta den missade dosen utan vänta och ta nästa dos på vanliga tiden. Om du helt har glömt en dos ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.

- **Tagit dubbel dos?**

Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.

- **Kräks?**

Om du kräks inom en halvtimme efter att du tog senaste dosen ska du ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.