

## **EVIPLERA**

### **Hur ska man ta Eviplera?**

- På apoteksetiketten står hur stor dos du ska ta.
- Eviplera tas en gång om dagen med 24 timmars mellanrum.
- Eviplera måste tas tillsammans med mat.
- Eviplera ska sväljas hel, tablettens får inte tuggas eller krossas.

### **Hur ska Eviplera förvaras?**

Förvara Eviplera i rumstemperatur (högst 25°C). Tabletterna är fukt känsliga så förvara dem i burken och skruva åt locket ordentligt.

### **Vilka läkemedel kan man inte ta med Eviplera?**

Tala om för din läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta din läkare om du får nya mediciner utskrivna.

Några av de läkemedel som inte skall användas samtidigt med Eviplera är:

Protonpumpshämmare så som Omeprazol, Losec, Pantoprazol, Pantoloc, Lansoprazol, Lanzo, Esomeprazol, Nexium. Läkemedel som innehåller rifampicin (Rifadin och Rimactan) eller rifabutin (Ansativin). Läkemedel mot epilepsi innehållande karbamazepin (Tegretol, Trimonil, Hermolepsin), oxkarbamazepin (Trileptal), fenobarbital (Fenemal) eller fenytoin (Epanutin, Lehydan, Fenantoin). Preparat som innehåller Johannesört.

### **Vilka receptfria preparat kan man ta med Eviplera?**

Du kan till exempel ta Alvedon och Panodil för att lindra värk och feber. Dimor, Imodium eller Loperamid kan tas vid diarré och t.ex. Zyrlex, Cetirizin eller Acura vid allergi. Diskutera med din läkare om du behöver läkemedel mot halsbränna eller sur mage.

### **Vad kan Eviplera ge för biverkningar?**

En del personer får biverkningar av Eviplera. Besvären varierar från person till person och kan vara illamående, yrsel, huvudvärk, magont, diarré, trötthet, sömnlöshet, konstiga drömmar och utslag.

### **Kan man dricka alkohol när man tar Eviplera?**

Små mängder alkohol påverkar inte Eviplera. Du ska ta Eviplera som vanligt även om du intar en alkoholhaltig dryck. Tänk på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

### **Vad gör man om man:**

- **Glömt att ta en dos Eviplera?**  
**Försök komma ihåg att ta Eviplera på rätt tid!** Om du märker detta inom 12 timmar efter att den missade dosen skulle ha tagits ska du ta tabletten tillsammans med mat så snart som möjligt. Men om du märker det senare än 12 timmar efter att den missade dosen skulle ha tagits ska du hoppa över den dosen och ta nästa dos som vanligt. Om du helt har glömt en dos ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.

- **Tagit dubbel dos?**

Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.

- **Kräks?**

Om du kräks inom 4 timmar efter att du tagit din dos ska du ta en ny dos tillsammans med mat. Om du kräks efter 4 timmar efter du tagit din dos ska du inte ta en ny dos utan ta nästa dos som vanligt. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

### **Vem ska man prata med om man har några frågor?**

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.