

ISENTRESS

Hur ska man ta Isentress?

- På apoteketiketten står hur stor dos du ska ta.
- Isentress tas 2 gånger om dagen med 12 timmars mellanrum.
- Isentress kan tas antingen med eller utan mat och dryck.
- Tabletterna bör sväljas hela.

Hur ska Isentress förvaras?

Förvara Isentress i rumstemperatur.

Vilka läkemedel kan man inte ta med Isentress?

Det är viktigt att du talar om för din behandlande läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta alltid din läkare då du får nya mediciner utskrivna.

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen tagit läkemedel som Rifadin, Rimactan, Rimacetazid, Rimcure, Rimstar eller läkemedel för behandling av magsår eller halsbränna t.ex Inside, Losec, Omeprazol, Rani-Q, Ranitidin, Zantac.

Vilka receptfria preparat kan man ta med Isentress?

Du kan till exempel ta: Alvedon, Panodil eller Reliv för att lindra värk och feber. Vid diarré kan du ta Dimor, Imodium eller Loperamid. Vid allergi kan du ta Acura, Cetirizin eller Zyrlex.

Vad kan Isentress ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Isentress. Besvären varierar från person till person. Vanliga biverkningar är huvudvärk, yrsel, hudutslag, illamående, diarré eller andra magbesvär och trötthet.

Om du får yrsel bör du undvika bilkörning och andra riskfyllda uppgifter.

Om du blir gravid, tala genast om det för din läkare.

Isentress innehåller laktos.

Kan man dricka alkohol när man tar Isentress?

Isentress kan ge yrsel och den effekten kan förstärkas av alkohol. Tänk också på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos?**
Försök komma ihåg att ta Isentress på rätt tid! Om du glömmer en dos ska du ta den så snart du kommer på det. Fortsätt sedan din medicinering som vanligt. Om du helt har glömt en dos ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.
- **Tagit dubbel dos?**
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.
- **Kräks?**
Om du kräks inom en halvtimme efter att du tog senaste dosen ska du ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.