

KALETRA

Hur ska man ta Kaletra?

- På apoteksetiketten står hur stor dos du ska ta.
- Kaletra tas två gånger om dagen med 12 timmars mellanrum.
- Kaletra finns som tablett och oral lösning.
- Kaletra oral lösning ska tas med mat. Kaletra tablett kan tas med eller utan mat.

Hur ska Kaletra förvaras?

Kaletra oral lösning ska förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Under användning kan den dock förvaras i rumstemperatur (under 25°C) i 6 veckor.

Kaletra tablett förvaras i rumstemperatur.

Vilka läkemedel kan man inte ta med Kaletra?

Tala om för din läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta din läkare om du får nya mediciner utskrivna.

Några av de läkemedel som inte ska användas samtidigt med Kaletra är: Halcion, Triazolam, Dormicum, Midazolam, Rifadin, Rimactan, Rimactazid, Rimstar, Cordarone och vissa mediciner mot migrän: Orstanorm, Anervan. Du ska inte heller använda preparat som innehåller Johannesört eller Echinacea.

Kaletra kan försämra p-pillers effekt och ytterligare skydd skall därför användas, till exempel kondom.

Vilka receptfria preparat kan man ta med Kaletra?

Du kan till exempel ta Alvedon och Panodil för att lindra värk och feber. Dimor, Imodium eller Loperamid kan tas vid diarré och Zyrlex, Cetirizin eller Acura vid allergi. Link, Novalucol, Novaluzid och Rennie kan tas mot halsbränna och sur mage.

Vad kan Kaletra ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Kaletra. Besvären varierar från person till person och kan vara illamående, kräkningar och huvudvärk.

Kan man dricka alkohol när man tar Kaletra?

Små mängder alkohol vid enstaka tillfällen påverkar inte Kaletra. Tänk dock på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos?**
Försök komma ihåg att ta Kaletra på rätt tid! Om du glömmer en dos ska du ta den så snart du kommer på det. Fortsätt sedan din medicinering som vanligt. Om du helt har glömt en dos ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.
- **Tagit dubbel dos?**
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.
- **Kräks?**
Om du kräks inom en halvtimme efter att du tagit din dos ska du ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.