

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

NORVIR som förstärkare (booster)

Hur ska man ta Norvir?

- På apoteketiketten står hur stor dos du ska ta.
- Norvir används som förstärkare av vissa andra HIV-läkemedel och tas 1 eller 2 gånger om dagen beroende på vilket annat HIV-läkemedel man tar.
- Norvir tas tillsammans med mat.
- Tabletterna brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vatten.
- Norvir i flytande form (mixtur) ska skakas ordentligt innan den mäts upp i doseringsmättet.
- Smaken på mixturen kan förbättras genom att tillsätta drickchoklad. Ät något efter att du tagit dosen så försvinner eftersmaken.

Hur ska Norvir förvaras?

Norvir ska förvaras i rumstemperatur, mixturen vid högst 25°C. Tabletterna är fukt känsliga så förvara dem i burken och se till att skruva åt locket.

Vilka läkemedel kan man inte ta med Norvir?

Det är viktigt att du talar om för din behandlande läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta alltid din läkare då du får nya mediciner utskrivna.

Berätta att du tar Norvir om du läggs in på sjukhus.

Du ska till exempel inte ta: Cordarone, Petidin, Halcion, Stesolid, Simvastatin, Zocord, Midazolam, Clozapine, Laponex, Tambocor, Rytmonorm, Brexidol, Alfuzosin, Xatral, Anervan och Orstanorm. Du ska inte heller använda preparat som innehåller fusidinsyra (mot bakterieinfektioner) eller naturpreparat som innehåller Johannesört eller Echinacea.

Norvir kan försämra p-pillers effekt och ytterligare skydd ska därför användas, till exempel kondom.

Vilka receptfria preparat kan man ta med Norvir?

Du kan till exempel ta Alvedon eller Panodil för att lindra värk och feber. Dimor, Imodium eller Loperamid kan tas vid diarré och Zyrlex, Acura eller Cetirizin vid allergi. Link, Novalucol, Novaluzid eller Rennie kan tas mot halsbränna och sur mage.

Vad kan Norvir ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Norvir. Besvären varierar från person till person och kan vara illamående, smakförändringar, kräkningar, diarré, stickningar runt mun och i ben och armar. Illamåendet avtar efter ungefär en månads behandling.

Kan man dricka alkohol när man tar Norvir?

Små mängder alkohol vid enstaka tillfällen påverkar inte Norvir. Tänk dock på att andra läkemedel du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos?**
Försök komma ihåg att ta Norvir på rätt tid! Om du glömmer en dos ska du ta den så snart du kommer på det. Fortsätt sedan din medicinering som vanligt. Om du helt har glömt en dos ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda, utan ta vanlig dos.
- **Tagit dubbel dos?**
Fortsätt som vanligt med din medicinering, alltså ta nästa dos som planerat.
- **Kräks?**
Om du kräks inom en halvtimme efter att du tagit din dos ska du ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.