

TRIZIVIR

Hur ska man ta Trizivir?

- På apoteketiketten står hur stor dos du ska ta.
- Trizivir tas 2 gånger om dagen med 12 timmars mellanrum.
- Trizivir kan tas antingen med eller utan mat.
- Tabletter brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vätska.

Hur ska Trizivir förvaras?

Förvara Trizivir i rumstemperatur.

Vilka läkemedel kan man inte ta med Trizivir?

Vissa mediciner ska inte tas tillsammans med Trizivir. Det är därför viktigt att du talar om för din behandlande läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta alltid din läkare då du får nya mediciner utskrivna.

Tala om att du tar Trizivir om du läggs in på sjukhus. **Bär alltid med dig varningskortet som finns i förpackningen!**

Vilka receptfria preparat kan man ta med Trizivir?

Det går bra att vid enstaka tillfällen ta Alvedon eller Panodil för att lindra värk och feber. Dimor, Imodium och Travello kan tas vid

diarré, Camalox, Link, Novalucol och Novaluzid vid halsbränna och sur mage, Clarityn och Versal vid allergi.

Vad kan Trizivir ge för biverkningar?

En del personer får biverkningar av Trizivir. Besvären varierar från person till person och är oftast övergående.

Vissa personer kan få en reaktion av Trizivir som ger andfåddhet, halsont, hosta , utslag , illamående, kräkningar, diarre, smärtor i magen, trötthet, värk i kroppen och allmän sjukdomskänsla. Om du får något/några av dess symtom under de första 6 veckorna av behandlingen, kontakta din läkare.

Avbryt aldrig behandlingen och påbörja aldrig behandling på nytt efter ett avbrott utan att rådfråga din läkare.

Magbesvären kan minska om Trizivir tas tillsammans med mat.

Kan man dricka alkohol när man tar Trizivir?

Vissa personer mår illa om de dricker alkohol när de tar Trizivir. Tänk också på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.

Vad gör man om man:

- **Glömt att ta en dos?**
Om det gått mindre än 6 timmar sedan du skulle ha tagit din dos ska du ta den glömda dosen så snart som möjligt. Vänta annars tills nästa dos ska tas. Dubblera inte nästa dos för att kompensera för den glömda.
- **Tagit dubbel dos?**
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som planerat.
- **Kräks?**
Om du kräks inom en halvtimme efter att du tog senaste dosen ska du ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Apoteket Huddinge sjukhus
2004-12-18
Upphovsrätt: Infektionskliniken och Apoteket
Uppdatering ombesörjs av Apoteket Huddinge sjukhus