

متأسفانه امروز برای دادن کاهش درد دیر شده است

مطابق خط مشی ما کودکان کمتر از 7 سال باید همیشه از امکان کاهش درد هنگام گرفتن آزمایش خون از رگ، برخوردار باشند. برای کاهش درد از چسب یا کرم EMLA® استفاده می شود

چسب باید 1 ساعت، گاهی اوقات بیشتر روی پوست باشد تا به بهترین وجه درد را کاهش دهد. بنابراین امروز فرصت نمی کنیم قبل از تعطیل شدن آزمایش ها را بگیریم.

ما محل گذاردن چسب را بشما نشان دهیم و شما در خانه چسب را در محل های مشخص شده بگذارید.

چسب باید قبل از اینکه شما برای گرفتن آزمایش به ما مراجعه می کنید، 1 ساعت، گاهی اوقات بیشتر روی پوست بوده باشد.

وقتی چسب برداشته شد باید قبل از گرفتن آزمایش 10 تا 15 دقیقه صبر کرد.

اگر می خواهید که ما چسب را بگذاریم باید حداقل 2 ساعت قبل از وقت تعطیل شدن به ما مراجعه کنید.

ما روزی را انتخاب می کنیم که به بهترین وجه برای شما مناسب باشد.