

Trombosprofylax vid covid-19 hos gravid, riktlinje

Gravida med covid-19 med lindriga symtom behöver inte trombosprofylax. Vid immobilisering i hemmet alt uttalade riskfaktorer tex obesitas, högt blodtryck, diabetes kan profylax med LMWH komma ifråga.

Gravida kvinnor som söker slutenvården pga. uttalade symtom på covid -19 men ej behöver inläggning:

Provtagning:

SARS-CoV2 nasopharynx PCR.

APTT, fibrinogen, CRP, D-dimer, PK-INR, antitrombin och blodstatus.

Ska ha trombosprofylax med Fragmin normaldosprofylax

<90 kg ges 5000E Fragmin x 1

>90kg ges 7500E Fragmin x 1.

Planeras för telefontid för provsvar dagen efter. Ska ha Fragmin profylax i 2–4 veckor med telefonkontakt för ställningstagande till fortsatt profylax efter ungefär 2 veckor.

Ställningstagande till fortsatt profylax beroende på tillfriskningsgrad och andra riskfaktorer, ev. ny kem lab enligt ovan om indicerad.

Obs kontraindikationer för trombosprofylax, ex blödningsbenägenhet.

Gravida kvinnor som vårdas ineliggande pga. covid-19:

Provtagning enligt ovan.

- Patienter med lindrig-måttlig symtombild: Profylax normaldos enligt ovan.
- Patienter med uttalad symtombild: Profylax högdos

<90kg ges Fragmin 5000E x 2

>90kg ges Fragmin 7500E x 2

Gravida som skrivs ut efter behandling för covid-19:

Om påvisad tromboembolism under vårdtiden gäller särskilt PM.

Ställningstagande till normaldos eller högdosprofylax ska tas innan utskrivning beroende på lab svar, sjukdomsduration, allvarlighetsgrad och övriga riskfaktorer.

- Om förlöst ska patienten ha profylax i 4 veckor från utskrivning med telefonkontakt till spec MVC innan 4 veckor för ställningstagande till ev förlängning beroende på tillfriskningsgrad och andra riskfaktorer, ev ny kem lab enligt ovan om indicerad.

Handläggare: Helena K Thulin/Karolinska/SLL;Åsa Hällström/Karolinska/SLL
Fastställare: Filippa Nyberg/Karolinska/SLL
Organisation:

Dokumentnr: STAB6933
Version: 1
Giltig fr o m: 2020-11-16
Utskriftsdatum: 2021-07-29

- Om patienten är gravid vid utskrivning ska patienten ha profylax i minst 4 veckor med telefonkontakt till SpecMVC innan 4 veckor för ställningstagande till ev. förlängning beroende på tillfriskningsgrad och andra riskfaktorer, ev. ny kem lab enligt ovan om indicerad.

Referenser:

1. SFOG råd trombosprofylax vid Covid – 19. (April 2020)
2. Karolinska; PM; Utskrivning av patienter som drabbas av venös tromboembolism eller fått trombosprofylax under vårdtiden pga covid-19. (April 2020)
3. Jecko Thachil, Ning Tang, Satoshi Gando , Anna Falanga , Marco Cattaneo , Marcel Levi , Cary Clark , Toshiaki Iba: ISTH Interim Guidance on Recognition and Management of Coagulopathy in COVID-19. Practice Guideline J Thromb Haemost 2020 May;18(5):1023-1026. doi: 10.1111/jth.14810. Epub 2020 Apr 27.

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2			
1	2020-11-16	Ny riktlinje. Utarbetad av Trine Karlsson och Maria Sennström, ME Graviditet och Förlossning, Tema Kvinnohälsa.	Filippa Nyberg

Handläggare: Helena K Thulin/Karolinska/SLL;Åsa Hällström/Karolinska/SLL
Fastställare: Filippa Nyberg/Karolinska/SLL
Organisation:

Dokumentnr: STAB6933
Version: 1
Giltig fr o m: 2020-11-16
Utskriftsdatum: 2021-07-29